



آشنایی با مدیریت مصرف مواد در اورژانس

opium

دکتر علیرضا قاسمی طوسی

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها

متخصص پزشکی قانونی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

کارشناس حقوق

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا و طالقانی و کامیاب مشهد

۰۹۱۵۱۱۵۷۹۵۳

Alireza.ghasemitoussi@yahoo.com

Alireza.ghasemitoussi@gmail.com

مسمومیت با مواد توهم زا

Hallucination drug

تترا هیدروکانابینول (THC)

- ماده اصلی حشیش، ماری جوانا یا کانابیس است که معمولاً به صورت تدخینی به کار می روند.

گیاه شاهدانه



اسامی و مشتقات دیگر ماری جوانا

- بنگ
- چرس
- شاهدانه
- سیگاری
- علف
- گل
- حشیش
- وید
- ماری

معجون بیرجندی

(کیک خنده، حلوائ بیرجندی، لوز، کلوچه)



مسمومیت با کانابیس (حشیش)

- به دنبال مصرف کانابیس (حشیش) به صورت تدخینی، اثرات یوفوریک آن در عرض چند دقیقه ظاهر شده، پس از ۳۰ دقیقه به اوج خود می‌رسد و ۲ تا ۴ ساعت باقی می‌ماند ولی اثرات شناختی ممکن است تا ۱۲ ساعت طول بکشد

علائم و نشانه‌های مسمومیت با کانابیس عبارتند از:

- یوفوری یا دیس‌فوری
- خنده بی‌دلیل
- اختلال در قضاوت
- پرخونی ملتحمه
- افزایش اشتها
- خشکی دهان
- تاکی‌کاردی
- میدریاز
- ندرتاً توهم
- هذیان‌گزند و آسیب (persecutory delusion)
- دلیریوم همراه با علائم پانیک (در دوزهای بسیار زیاد)
- سایکوز تا ۶ هفته (در دوزهای بسیار زیاد)

نکته بسیار مهم

وابستگی به کانابیس (حشیش) روانی و نه جسمی است.

تشخیص

• 1- کلینیکی

• 2- پاراکلینیکی

درمان

- مسمومیت با کانابیس معمولاً نیاز به درمان ندارد.
- جهت کنترل اضطراب از داروهای ضد اضطراب
- در درمان توهم و هذیان از داروهای ضد جنون استفاده می‌شود. (خطر تشنج)